JANVIER 1912

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation.)

Floraire — Chêne-Bourg, GENÈVE

29me CATALOGUE DE GRAINES

Terrestria sidera, flores.



	Pages		Pages
Espèces montagnardes et de rochers	1	Graines de cactées rustiques	39
Graines de plantes vivaces d'ornement	33	» diverses	40

INTRODUCTION

In presenting my catalogue of seeds for 1912 I beg to thank my patrons for their past favours and to assure them that I greatly appreciate their support and shall pay the same attention to their wishes as before. In order to facilitate the execution of their orders I have appointed an agent in England, from whom catalogues may be obtained and to whom orders may be addressed. I trust that this new departure will be of help to my patrons and be regarded by them as earnest of my desire to consult their convenience.

TERMS OF BUSINESS

English Agency. All orders and communications may be addressed to Mr. E. W. Clayforth, Oak Mount, Highfield, Southampton, to whom remittances may be made.

Accounts are due Quarterly and strictly net. The reduced prices quoted for collections are for cash within 14 days of the receipt of invoice. Remittances should be made by crossed cheques or postal orders.


Small and Occasional Orders. Customers are respectfully requested to send remittances in prepayment as such orders do not admit of the cost involved in bookkeeping. Receipts for sums of less than 2/6 will not be sent unless a $^1/_2{}^d$ stamp is enclosed.

Carriage. All seeds are sent carriage paid.

Catalogue of Plants : this will be ready in March 1912 and will be forwarded to all patrons without delay.

PARTICULAR ATTENTION

Is respectfully called to the fact that a stock of the more popular alpine seeds is kept by my agent from whom they may be obtained by return of post as promptly as from any house located in England.



Espèces montagnardes et de rochers.

Seeds of alpine and mountain plants.

Nous ne donnons pas ici la description des plantes parce que la plupart de nos clients possèdent le petit volume « Plantes alpines et de rocailles et leur culture » par H. Correvon et que, d'autre part, notre catalogue de plantes contient plusieurs de ces descriptions.

Toutes nos semences se vendent aux prix de 50 centimes le paquet.

Les personnes que le choix d'une collection embarrassent, peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines d'espèces montagnardes et vivaces aux prix suivants *à notre choix :*

12 espèces pour	5 francs.
25 » »	10 »
50 » »	20 »
100 » »	40 »

Our seeds are sold to the price of 50 cts. (5 d.) each paquet.
We make collections to our own choice:

12 kinds for	5 francs	(4 sh.)
25 » »	10 »	(8 sh.)
50 » »	20 »	(16 sh.)
100 » »	40 »	(32 sh.)



A Floraire.

Espèces montagnardes et de rochers.

Pour simplifier, nous avons placé sous cette rubrique les graines reçues en 1911 du Groënland, de l'Himalaya, du Caucase, du Colorado, des Etat-Unis, du Turkestan, d'Orient, des Canaries, des Carpathes, etc. La plupart de nos graines pourtant ont été récoltées par nous soit à Floraire, soit dans les Alpes en 1911.

Abronia umbellata.
» villosa.
Acæna glabra.
» myriophilla.
» ovalifolia.
» ovina.
» sarmentosa.
» trifida.
Charmantes plantes gazonnantes propres à garnir les rocailles et les sous-bois.
Acantholimon Balansæ.
» Fomini.
» glumaceum.
» graminifolium.
Acantholimon Karelini.
» lepturoides.
» tenuiflorum.
» venustum.
Achillea abrotanoides.
» ageratifolia.
» ambigua.
» ageratum.
» atrata.
» Buglossis.
» carpathica.
» Clavenæ.
» Correvoniana.
» filipendula.
» Hausknechtii.

Achillea herba Rota.
» impatiens.
» inpunctata.
» Kellereri.
» ligustica.
» lingulata.
» macrophylla.
» mongolica.
» moschata.
» nana.
» pectinata.
» rupestris.
» serbica.
» setacea, belle espèce basse à fl. jaune vif.
» sibirica.
» tomentosa.
» umbellata.
Aconitum anthora (Aconits).
» barbatum.
» Cammarum. Belle plante vigoureuse et solide aux fleurs bleu violacé.
» cernuum.
» Columbianum.
» decorum.
» flavescens.
» lycoctonum.
» moldavicum.
» napellus.
» » à fl. blanches.
» paniculatum. Espèce élancée, aux tiges étalées en candélabres.
» pyrenaicum.
» septentrionale.
» tauricum.
» umbrosum.
» uncinatum.
» variegatum.
» » var. album.
» Wilsoni.
Actæa rubra.
» spicata.
Adenophora denticulata.
» liliifolia.
» » à fl. blanches.
» polymorpha.
» Potanini.
Ce sont des campanules gracieuses. à floraison prolongée et très solides.
» verticillata.
Adenostyles albifrons.
» alpina.
» Kerneri.
» leucophylla.
Adonis pyrenaica.
Plante rare et belle, à floraison précoce. Graines récoltées dans les Pyrénées.
Adonis vernalis. Grande Anémone à fl. d'or; Mars-Avril.
Aethionema armenum.
» Cappadocicum.
» cordatum *(Eunomia cordata)*.
» coridifolium *(Iberis jucunda)*.
» grandiflorum.
» iberideum.
» persicum.
» saxatile.
» schistosum.
» stylosum.
» Thomasianum (rarissime).
Jolies pl. naines à fl. roses; abondante floraison; cult. facile.
Agrostemma coronaria.
Ajuga pyramidalis.
Alchemilla alpina.
» Helvetica.
» incisa.
» Lapeyrousei.
» pubescens.
» splendens.
» vulgaris.
Alfredia cernua.
» nivea.
» stenolepis.
Allium afflatunense.
» maritimum.
» Moly.
» neapolitanum.
» odorum.
» pedemontanum.
» Schuberti.
» Victoriale (Herbe à 9 chemises).
Alsine austriaca.
» Banatica.
» gerardi.
» hirsuta.
» Jacquini.
» juniperifolia.
» laricifolia.
» liniflora.
» pinifolia.
» recurva.
» Rosani.
» setacea.
» tenuifolia.
» villarsii.
Alyssum alpestre.
» argenteum.
» calyocarpum.
» condensatum.
» creticum.
» gemonense.

Alyssum halimifolium.
» hirsutum.
» leucadeum.
» Mœllendorfianum.
» montanum.
» orientale.
» petræum.
» pyrenaicum.
» rostratum.
» saxatile.
» » var. citrinum.
» scardicum.
» serpyllifolium.
» spinosum.
» stribnyi.
» Wiersbickii.
» Wulfenianum.
Amelanchier utahensis.
Amphirapis albescens.
Amphicome arguta.
Amygdalus nana.
Amsonia latifolia.
» salicifolia.
Très jolies pl. de la famille des Pervenches.
Anacyclus Formosus.
» officinarum.
Andrachne colchica.
Androsace arachnoidea.
» Brigantiaca.
» carnea.
» chamaejasme.
» Charpentieri.
» ciliata.
» cylindrica.
» elongata.
» foliosa.
» glacialis.
» Hausmanni.
» Hedreantha.
» Helvetica.
» imbricata *(argentea)*.
» lactea.
» Laggeri.
» lanuginosa.
» multiceps.
» obtusifolia.
» occidentalis.
» Pacheri.
» primuloides.
» pubescens.
» pyrenaica.
» sarmentosa.
» septentrionalis.
» villosa.
» vitaliana.
» Wulfeniana.
Anemone alpina.
C'est la grande et belle anémone à fl. blanches des régions alpines. On l'élève facilement de graines, mais celles-ci germent lentement.
Anemone apennina.
» Baïkalensis.
» Baldensis.
» canadensis.
» cernua.
» decapetala.
» globosa.
» Halleri.
» Hepatica (Hépatique).
» Lyalli.
» montana.
» multifida.
» narcissiflora.
L'une des plus faciles à cultiver, mais à germination lente; fl. roses en jolis bouquets dressés.
» nigricans.
» oregana.
» patens.
» polyantha.
» pratensis.
» » var. obsoleta.
» pulsatilla.
» » var. alba.
» Regeliana.
» rivularis.
» rubra.
» sulfurea, la belle anémone soufrée des Alpes.
» sylvestris.
Grande fl. blanche à revers rose; pl. envahissante et de culture facile.
» transylvanica.
» trifoliata.
» vernalis (à fleurs de soie et d'opale).
Anemonopsis macrophylla.
Angelica Archangelica *(Angélique)*.
» pyrenaica.
Antennaria alpina.
» carpathica.
» dioica.
» monocephala.
» plantaginea.
Anthemis aetnensis.
» aizoon.
» Biebersteini.
» carpathica.
» cinerea.
» montana.
» nobilis (camomille romaine).

Anthemis rigescens.
» tenuifolia.
Anthericum ramosum. Petit lys blanc des rochers, très florifère.
Anthyllis montana.
» vulneraria.
Antirrhinum asarina.
Excellent pour les murs et rochers au soleil.
» majus, type sauvage.
» siculum.
Aplopappus croceus.
» Parryi.
Aphyllanthes monspeliensis.
Apocynum venetum.
Aposeris fœtida.
Aquilegia alba (Ancolies).
» alpina.
» arctica.
» atrata.
» atropurpurea.
» baïkalensis.
» bertoloni.
» burgeriana.
» californica.
» canadensis.
» caucasica.
» chrysantha.
» cœrulea (Floraire).
» cœrulea (Montagnes Rocheuses).
» alba.
» ecalcarata.
» flabellata. Blanc pur.
» » nana.
» glandulosa (type).
» » var. rosea.
» jucunda.
» lactiflora.
» longicalcarata.
» moorcroftiana.
» nivea.
» Olympica.
» Othonis.
» oxypetala.
» pyrenaica.
» skinneri. Fl. rouge et jaune.
» stenopetala.
» Stuartii.
» thalictrifolia.
» truncata. Fl. rouge et jaune brillante.
» vulgaris.
(voir graines Plantes vivaces).
Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture, très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant la mi-ombre, la fraîcheur.

Arabis albida.
» alpina.
» arenosa.
» aubrietioides.
» bellidifolia.
» caucasica.
» cebennensis.
» cœrula.
» Drummondi.
» grandiflora superba.
» Halleri.
» hirsuta.
» Holbœlli.
» hybrida.
» japonica.
» lucida.
» pendula.
» petrogena.
» procurrens.
» pumila.
» rosea.
» Soyeri.
» suecica.
Arctostaphylos alpina.
» tomentosa.
» Uva Ursi *(Raisin d'Ours).*
Arenaria biflora.
» cæspitosa.
» cephalotes.
» ciliata.
» gracilis.
» graminifolia.
» grandiflora.
» gypsophiloides.
» hispida.
» Kotschyana.
» lanceolata.
» laricifolia.
» Ledebouriana.
» nardiflora.
» peploides.
» purpurascens.
» Sajanensis.
» sericea.
» Steveni.
» tetraquetra.
» verna.
Argemone hispida.
» mexicana.
» platyceras.
Pavots épineux d'Amérique.
Arisarum vugare.
Armeria alpina.
» Adamowiczii.
» arborea.
» Berlengensis.
» canescens.
» majellensis.

Armeria maritima.
» plantaginea.
» setacea.
» vulgaris.
Pl. solides et florifères connues sous le nom de gazon d'Espagne ou d'Olympe.
Arnebia echioides.
Arnica chamissonis.
» cordifolia.
» latifolia.
» longifolia.
» montana (véritable *Arnica)*.
Aronia floribunda.
» rotundifolia.
Aronicum glaciale
» scorpioides.
Artemisia absinthium.
» annua.
» arborea.
» argentea.
» atrata.
» austriaca.
» canadense.
» discolor.
» frigida.
» glacialis.
Le Genêpi des Piémontais.
» glauca.
» granatensis.
» lanata.
» maritima.
» mutellina *(genépi du Valais)*.
« nana.
» rupestris.
» sacrorum.
» spicata *(le vrai genépi)*.
» tridentata.
» valesiaca.
Jolies composées alpines aromatiques au feuill. finement divisé et généralement blanc d'argent. Soleil.
Arthropodium cirrhatum.
Arum Dracunculus.
» italicum.
Asarum canadense.
» caudatum.
» europæum.
Asparagus acutifolius.
» tenuifolius.
Asperula azurea.
» cynanchica.
» galioides.
» longiflora.
» odorata *(Waldmeister)*.
» orientalis.
» humifusa.

Asperula taurina.
Asphodelus albus *(Asphodèle)*.
» fistulosus.
Asphodeline Balansæ.
» cretica.
» gigantæ.
» lutea.
Aster alpinus (Grande marguerite lilas).
» » à fl. blanches.
» » à fl. rouges.
» » speciosus.
» Amellus.
» bessarabicus (A. ibericus).
» caucasicus.
» conspicuus.
» curtisii.
» diplostephioides.
» Douglasi.
» Fremonti.
» Garibaldii.
» himalaicus.
» laevis.
» leucanthemus.
» Porteri.
» Ptarmicoides.
» Pseudo-Amellus.
» pumilus.
» pyreneus (vrai).
» sericeus.
» simplex.
» Tripolium.
» turbinellus.
Asterocarpus sesamoides.
Astilbe Davidi.
Délicate panicule de fl. roses, dressée en gros épis.
» Japonica.
» rivularis.
Astragalus alopecuroides.
» aristatus.
» cicer.
» confirmans.
» gremlii.
» hamosus.
» juvenalis.
» maximus.
» monspessulanus.
» Onobrychis.
» pseudo-Onobrychis.
» racemosus.
» reflexistipulus.
» Sieversianus.
» Transoxanus.
Astrantia bavarica.
» Biebersteinii.
» carinthiaca.
» carniolica.
» gracilis.

Astrantia major *(Etoile des Alpes)*.
Plante très montagnarde et des plus facile à cultiver.
» major à fl. roses.
» minor.
» neglecta.
» pauciflora.
Astrocarpus sesamoides.
Athamante cretensis.
» Matthioli.
» vestina.
Atragene alpina.
» » à fl. blanc pur.
» » à fl. rouges.
» sibirica.
Atriplex canescens.
» hortensis.
» rosea.
Atropa Belladona *(Belladone)*.
» » à fruits jaunes.
Aubrietia antilibani.
» cilicica.
» deltoidea.
» Eyrii.
» græca.
» Hendersonni.
» Leichtlini.
» Pinardi.
» purpurea.
» violacea.
Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fl. d'un lilas plus ou moins vif suivant les espèces. Excellentes pour les murailles.
Avena argentea.
» elatior.
» flavescens.
Azalea procumbens.
Ballota spinosa.
Banffia petræa.
Baptisia australis.
» exaltata. Gros Lupins vivaces à fl. bleues.
Bartsia alpina.
Bellidiastrum Michelli.
Bellis perennis.
Bellium bellioides.
» crassifolium.
Berardia subacaulis. Pl. très curieuse et très rare, récoltée dans la station classique du Haut Queyras.
Berkheya purpurea.
Berteroa incana.
Beta trigyna.
Betonica alopecuros.
» grandiflora.
Betonica grandiflora superba.
» hirsuta.
» macrostachya.
» officinalis.
» » alba.
» stricta.
Betula nana.
Biebersteinia orphanidis.
Bigelowia albicaulis.
» graveolens.
Biscutella lævigata.
» lucida.
Blitum capitatum.
» virgatum (Epinard-fraise).
Plantes très curieuses, portant comme des fraises d'un vermillion très vif, à l'aisselle des feuilles.
Bonjeania hirsuta.
Borago laxiflora.
Boykinia aconitifolia.
» elata.
» occidentale.
» rotundifolia.
Brassica repanda.
» Richeri.
Braya alpina.
» pinnatifida.
» supina.
Brickelia grandiflora.
Briza media.
» lutescens.
Bromus squarrosus.
» tectorus.
Brückenthalia spiculifolia.
Bryonia alba.
» dioica (pl. grimpantes).
Buphtalmum grandiflorum.
» salicifolium.
» speciosissimum.
Bupleurum falcatum.
» fruticosum.
» longifolium.
» ranunculoides.
» stellatum.
Butomus umbellatus (aquatique).
Cacalia hastata.
Caccinia glauca.
» Rauwolfii.
Calamintha acynos.
» alpina.
Calandrinia grandiflora.
» pygmæa.
» speciosa.
» umbellata.
Calla palustris (aquatique).
Caltha alpina.
» leptosepala.

Caltha palustris.
Callirhoe pedata.
» verticillata.
Calystagia dahurica.
Camomille (v. Anthemis nobilis).
Campanula abietina.
» acutangulare.
» alaskana.
» alliariæfolia.
» Allionii.
» » à fleurs blanches.
» americana.
» barbata.
» » à fl. blanches.
» Baumgartenii.
» betonicæfolia.
» Burghalti.
» cæspitosa.
» cantburyana.
» capitata.
» carnica.
» carpathica.
» » à fl. blanches.
» » à fl. lilas clair.
» » var. compacta.
» » var. Ditton's blue.
» » var. grandiflora.
» caucasica.
» cenisia.
» collina.
» dahurica.
» elatines.
» elatinoides.
» eriocalix.
» eriocarpa.
» excisa.
» garganica.
» glomerata.
» » var. à fl. blanches.
» » var. acaulis.
» grandis.
» » à fl. blanches.
» Grossekii.
» Hohenackeri.
» humosa.
» Imeritina.
» lactiflora.
» lamiifolia.
» latifolia.
» » à fl. blanches.
» libanotica.
» lingulata.
» longistyla.
» macrantha.
» » à fl. blanches.
» medium.
» michauxioides.
» mirabilis.

Campanula muralis.
» patula.
» pelviformis *(Hort.*, non *Lam.)*.
» persicifolia.
» petræa.
» petiolata.
» phytidocalix.
» primulæfolia.
» pulla.
» pulloides.
» punctata.
» pusilla.
» » var. à fl. blanches.
» pyramidalis.
» » à fl. blanches.
» Raddeana.
» Raineri.
» rapunculus.
» rapunculoides.
» rhomboidalis.
» rotundifolia.
» » à fl. blanches.
» » à fl. doubles.
» Sarmatica.
Très belle espèce voisine de barbata, facile à cultiver et très florifère.
» Saxifraga.
» Scheuchzeri.
» » à fl. blanches.
» Scouleri.
» sibirica.
» speciosa.
» spicata.
» stenocodon.
» subpyrenaica.
» Tenorii.
» thrysoidæa.
Belle espèce montagnarde à fl. jaunes.
» tomentosa.
» Trachelium.
» » à fl. blanches.
» turbinata.
» » à fl. blanches.
» tyroliensis.
» urticifolia.
» Valdensis.
» Vanneri.
» velutina.
» versicolor.

Les Camp. sont faciles à élever par semis. Les espèces les plus faciles, les plus florifères et les plus jolies sont : Alliariæfolia, carpathica, eryocarpa, lactiflora, persicifolia, pusilla, sarmatica et turbinata. Les alliariæf. et

nobilis sont à fl. blanches, thyrsoidæa à fl. jaunes et les autres à fl. lilas plus ou moins foncé, sauf leur var. à fl. blanches. Toutes fleurissent dans l'été, à partir de la fin de mai, et sont excellentes pour les rocailles ou la platebande.

Canarina campanula.
Capparis rupestris (Câprier).
Cardamine alpina.
» asarifolia.
» chenopodifolia.
» macrophylla.
» resedifolia.
Carduus aurisocus.
» defloratus.
» nutans.
Carex atrata.
» Baldensis.
» Buchanani (à verdure brune).
» flava.
» Grayi.
Carlina acanthifolia.
» acaulis.
Ce sont les superbes chardons d'argent qui, l'automne, animent les pentes de nos monts, où ils forment des touffes naines d'une grande beauté.
» vulgaris.
Castilleya angustifolia
» lutea.
Cathcartia villosa.
Cedronella triphylla.
Celsia Coromandelica.
» betonicæfolia.
» orientalis.
Centaurea alpina.
» axillaris.
» Babylonica.
» dealbata.
» Jordani.
» lutea.
» macrocephala.
» montana.
» » à fl. blanches.
» » à fl. roses.
» orientalis (à fl. jaunes).
» præalta.
» Ruthenica (à fl. jaune citron).
» rutifolia.
» spinulosa.
» uniflora.
Centranthus angustifolius.
» longiflorus.
» ruber (*Valériane rouge des murs*).
Cephalaria alpina.
» leucantha.
» uralensis.
Grandes scabieuses jaunes aux formes architecturales.
Cerastium album.
» alpinum.
» arvense.
» Biebersteini.
» bosniacum.
» chloræfolium.
» fontanum.
» glaciale.
» glandulosum.
» grandiflorum.
» illyricum.
» lanatum.
» Lerchenfeldianum.
» lineare.
» tomentosum.
» uniflorum.
» uralensis.
» villosum.
» vulgatum.
Ce sont de petites pl. traînantes aux innombrables fl. blanches formant de solides gazons.
Cerinthe alpina.
Chamæmelon caucasicum.
Chamæpeuce casabone.
» diacantha.
Chænostoma floribunda.
Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de Juin à fin Novembre; pl. de grand effet.
» alpinus.
» Cheiri.
» mutabilis.
Chelidonium Franchetianum.
Chenopodium Bonus Henricus.
Cherleria sedoides.
Chicorium Intybus.
» » à fl. blanches.
Chionodoxa Boissieri.
» Luciliæ.
Chrysanthemum alpinum.
» arcticum.
» caucasicum.
» cinerariæfolium.
» coronopifolium.
» lacustre.
» macrophyllum.
» maximum.
» subcorymbosum.
» uliginosum.
Chrysopsis Bolanderi.

Chrysopsis foliosa.
» villosa.
Chrysosplenium alternifolium.
» glaciale.
» oppositifolium.
» rosulare.
Cladothamnus pyrolifolius.
Cimicifuga fœtida.
» cordifolia.
» racemosa.
Cineraria aurantiaca.
» campestris.
» suaveolens.
Cirsium Eriophorum.
» Erysithales.
» heretophyllum.
» monspessulanus.
» spinosissimum.
Cistus albidus.
» ladaniferus.
» laurifolius.
» monspessulanus.
» salviæfolius.
Claytonia asarifolia.
» perfoliata.
Clintonia borealis.
» uniflora.
Cnidium Montenegrensis.
Cochlearia danica.
Codonopsis lanceolata.
» ovata.
» rotundifolia.
» sylvestris.
» Tangshan.
» viridiflora.
Collomia grandiflora.
Colutea persica.
Coluteocarpus reticulatus.
Comarum palustre.
Convallaria majalis *(Muguet)*.
Convolvulus altheoides.
» cantabricus.
» mauritanicus.
Coriara japonica.
» myrtifolia.
Coris monspeliensis.
Cornus canadensis.
» suecica.
Coronilla cappadocica.
» coronata.
» Emerus.
» emeroides.
» glauca.
» montana.
» valentina.
» varia.
Corrigiola telephiifolia.
Cortusa Mathioli.
Cortusa Mathioli grandiflora.
» pubens.
Corydalis australis.
» bulbosa.
» cheilanthifolia.
» lutea.
» nobilis.
» ochroleuca.
» ophiocarpa.
» solida.
» thalictrifolia.
» tuberosa (excellente pl. d'ombre).
» vaginans.
Cotoneastes depressa (espèce naine et de rocaille).
Cotyledon *(Umbilicus)* chrysanthus.
» ciliolatus.
» oppositifolius.
» platyphyllus.
» Sempervivum (Sedum sempervivum).
» spinosus.
Crepis aurea.
» blattarioides.
» montana.
» pygmæa.
» Terglouensis.
Crocus vernus.
Crucianella stylosa (fl. roses très abondantes).
» stylosa à fl. carmin.
Crythmum maritimum.
Cucubalus bacciferus.
Cyclamen coum.
» europæum.
» hederæfolium.
» ibericum.
» repandum.
Cypripedium calceolus.
» macranthum.
» spectabile.
» venticosum.
Cystisus albus.
» austriacus.
» capitatus.
Excellent arbrisseau de 1 m. à 1 m. et demi, qui se recouvre de fleurs jaunes pendant une bonne partie de l'année.
» filipes.
» hirsutus.
» leucanthus.
» nigricans.
» purgans.
» radiatus.
(Délicieux petit arbuste bas aux rameaux étalés, propre à garnir les rocailles).

Cystisus scoparius.
» sessilifolius.
(Très bel arbuste ornemental, à très riche floraison).
» stenopetalus.
Daphne alpina.
» altaica.
» arbuscula.
» aurea.
» caucasica.
» cneorum.
» Gnidium.
» Laureola.
» mezereum.
» » à fl. blanches.
» oleoides.
» pontica.
» pseudo-mezereum.
» striata.
Datisca cannabina.
Datura stramonium.
Delphinium albescens.
» azureum.
» Brunonianum.
» californicum.
» cachemirianum.
» » à fl. blanches.
» cardinale.
» chinense. Esp. superbe à fl. d'un bleu très pur.
» elatum.
» formosum.
» Geyeri.
» grandiflorum.
» nelsoni.
» nudicaule.
» occidentale.
» pellucidum.
» Requienii.
» scapulorum.
» staphysagria.
» superbissimum.
» Tatsuense.
» tirolense.
» triste (d'un brun-gris très curieux).
» Zalil (à fl. jaunes).
Voir en outre pl. vivaces.
Dentaria digitata.
» enneaphylla.
» laciniata.
» pinnata.
Dianthus acaulis.
» alpestris.
» alpinus.
» arenarius.
» aridus (fl. jaune soufre).
» armeria.

Dianthus atrorubens.
» asper.
» barbatus.
» bicolor.
» cæsius.
» » majus.
» capitatus.
» carthusianorum. Le joli petit œillet rose vif des pentes sèches.
» cariophyllus.
» controversus.
» corsicus.
» cruentus.
» deltoïdes.
» » albus.
» » superbus.
» dentosus.
» diadematus.
» fasciculatus.
» fragrans.
» frigidus.
» gallicus.
» giganteiformis.
» glacialis.
» glaucophyllus.
» graniticus.
» hispanicus.
» Holzeri.
» Hungaricus.
» Lereschei.
» Libanotis.
» Liburnicus.
» monspessulanus.
» montanus.
» neglectus.
» » var. grandiflorus.
» » var. nanus.
» nitidus.
» pallens.
» pelviformis.
» petræus.
» Plumarius.
L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.
» Plumarius var. grandiflorus.
» » » bicolor.
» » » floribundus.
» » » hortensis.
» » » lilacinus.
» » » maximus.
» » » robustus.
» » » suaveolens.

Dianthus Plumarius var. zonatus.
Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs.
» polycladus.
» puberulus.
» Seguieri.
» speciosus.
» subfastigiatus.
» superbus.
» » var. grandiflorus.
» » » nanus.
» sylvaticus.
» sylvestris.
» versicolor.
» wimmeri.
Les œillets, surtout dans le groupe des Plumarius, sont excellents pour garnir les lieux arides et ensoleillés; ils se contentent de peu et donnent avec abondance de délicieuses fl. odorantes, tous s'élèvent facilement de semis.
Dicentra eximia.
formosa.
Dictamnus albus.
» Fraxinella.
Digitalis ferruginea.
» grandiflora.
» lanata.
» lutea.
» mædia.
» purpurea.
» » à fl. blanches.
Ce sont des pl. solides et à flor prolongée; cult. très facile.
Dioscoræa caucasica.
» pyrenaica.
Diphylleia cymosa.
Dipsacus asper.
Dodecatheon integrifolium.
» Mædia.
» pauciflorum.
» radicatum.
Doronicum austriacum.
» caucasicum.
» hirsutum.
» Pardalianches.
Dorycnium herbaceum.
» ibericum.
» suffruticosum.
Downingia pulchella (Etats-Unis).
Draba affinis.
» aizoides.
« » v. grandiflora.
» altaica.
» arabisans.
Draba armata.
» athoa.
» aurea.
» borealis.
» bronchialis.
» brunifolia.
» cadmea.
» cappadocica.
» carinthiaca.
» chamæjasme.
» contorta.
» corsica.
» cuspidata.
» Dedeana.
» dichranoides.
» Fladnizensis.
» frigida.
» Haynaldi.
» hispanica.
» Johannis.
» Kotschyi.
» lactea.
» lasiocarpa.
» laxa.
» nivalis.
» olympica.
» pyrenaica (*Petrocallis*).
» repens.
» rupestris.
» Sauteri.
» scabra.
» Scandinavica.
» stellata.
» Thomasii.
» tomentosa.
» Traunsteineri.
» tridentata.
» Wahlenbergi.
» Zahlbruckneri.
Dracocephalum argunense.
» austriacum.
» botryoides.
» canariense.
» integrifolium.
» japonicum.
» nutans.
» peregrinum.
» » à fl. blanches.
» Ruprechti.
» Ruyschianum.
» speciosum.
» stramineum.
» thymifolium.
Drosera longifolia.
Dryas Drummondi.
» integrifolia.
» lanata.
» octopetala (*Dryade*).

L'une des plus gracieuses pl. tapissantes pour rochers; grandes fl. blanches; graines lèvent bien.
Drypis Jacquinianus.
» spinosa.
Echinops Karatavicus.
Echium petræum (*Lithospermum petr.*)
» rubrum.
» simplex (Gloire de Ténériffe).
Edelweiss (voir Leontopodium).
Edrayanthus Bosniacus.
» dalmaticus.
» graminifolius.
» serpyllifolius.
» tenuifolius.
Eleusine tristachia.
Elymus canadensis.
Empetrum nigrum.
Ephedra altissima.
» distachya.
» fragilis.
» Helvetica.
L'une des pl. les plus curieuses de la flore suisse.
» monostochya.
Epilobium abyssinicum.
» alpinum.
» anagallifolium.
» angustifolium.
» Fleischeri.
» frigidum.
» glabellum.
» hirsutum.
» latifolium.
» luteum.
» nummulariaefolium.
» origanifolium.
» pedunculare.
» rosmarinifolium.
Epimedium pinnatum.
Epipactis palustris.
Eranthis cilicica.
» yemalis.
Eremosparton aphyllum.
Eremurus Aitchisonii.
» altaicus.
» Bungei.
» caucasicus.
» Elwesianus.
» Himalaicus.
» Him-robustus.
» inderiensis.
» Kaufmanni.
» lactiflorus.
» marginatus.
» multiflorus.
» olgae.
Eremurus robustus.
» spectabilis.
» turkestanicus.
Erica carnea.
» stricta.
Très belle esp. des Apennins, parfaitement rustique.
» tetralix.
Erigeron alpinus.
» aurantiacus.
» caucasicus.
» compositus.
» Coulteri
» elatior.
» » grandiflorus.
» flagellaris.
» glabellus.
» glabratus.
» glaucus.
» hybridus roseus.
» macranthus.
» montanensis.
» oreganum.
» Philadelphicus.
» pulchellus.
» rupestris.
» salsuginosus.
» speciosus.
» trifidus.
» uniflorus.
» Villarsii.
Erinacea pungens.
Erinus alpinus.
» » à fl. blanches.
» hirsutus.
» » à fl. blanches.
» hispanicus.
Très jolies petites pl. à semer dans les vieux murs ou les rochers au soleil.
Eriogonum arboreum.
» campanulatum.
» flavum.
» racemosum.
» umbellatum.
Eriophorum angustifolium.
» latifolium.
» Scheuchzeri.
Eriophyllum caespitosum. Superbe composée à fl jaune vif, très florifère.
Eritrichium nanum. (Roi de l'Alpe.)
Erodium absinthoides.
» cheilanthifolium.
» chrysanthum.
» daucoides.
» Guicciardi.
» hymenodes.

Erodium macradenum.
» Manescavi.
L'une des meilleures pl. de roc. fleurissant tout l'été et l'automne. Grandes et belles fl. carmin vif.
» olympicum.
Erpetion reniforme.
Eryngium alpinum.
» amethystinum.
» Bourgati. *(Le superbe Chardon bleu des Pyrénées.)*
» cæruleum.
» campestre.
» Florariensis.
» giganteum.
» maritimum.
» Olivierianum.
» planum.
» Rottenbergi.
» serbicum.
» Yuccæfolium.
» Zabeli.
Erysimum Allionii.
» australe.
» chairanthoides.
» Helveticum.
» lepturoides.
» nanum.
» ochroleucum.
» odoratum.
» pulchellum.
Très jolie pl. rampante à fl. jaune vif; floraison prolongée; cult. facile.
» purpureum.
Erythræa centaurea.
» » alba.
» gothica.
» latifolia.
» linarifolia.
» littoralis.
» ramosissima.
» Rumelica.
Erythonium Dens Canis *(Dent de Chien)*.
» » à fl. blanches.
» Johnsoni.
» sibiricum.
Escholzia aurantiaca.
Euphorbia biglandulosa.
» canescens.
» Characias.
» Dendroides.
» Gerardiana.
» Myrsinites. Excellente pl. à semer dans les endroits arides et secs.
» polychroma.
Euphorbia robusta.
» spinosa.
Euphrasia lutea.
» montana.
Eurotia lanata.
Euryangium Sumbul.
Falcaria latifolia.
» Rivini.
Falkia repens.
Farsetia eriocarpa.
» clypeata.
» lunarioides.
» triquetra (rare).
Ferula Asa fœtida.
» communis.
» glauca.
» Karatavica.
Grandes ombellifères au feuillage finement divisé et hautement décoratives.
Festuca alpina.
» amethystica.
» crinum-Ursi *(Crin d'Ours)*, fin gazon qu'on ne fauche jamais.
» flavescens.
» glauca.
» Halleri.
» punctoria.
» rubra.
» valesiaca.
» violacea.
Petits gazons des montagnes à feuillage fin.
Fragaria indica.
Francoa appendiculata.
» racemosa.
» sonchifolia.
Frankenia pulverulenta.
Frasera speciosa.
Fritillaria askabadensis.
» delphinensis de la station classique du Queras; très belle.
» imperialis.
» Meleagris.
» pallidiflora.
Funkia cœrulea.
» minor.
Galanthus nivalis.
Galium Mollugo.
» purpureum.
» tenue.
Gaura coccinea.
Gaya simplex.
Genista ætnensis.
» anglica.
» aphyllum.
» austriaca.
» cinerea.

Genista florida.
» germanica.
» horrida.
» juncea.
Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.
» libanotica.
» pilosa.
» radiata.
» sagittalis.
» sibirica.
» tinctoria.
Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, pl. solides.
Gentiana acaulis.
L'une des meilleures pl. des Alpes; germination lente, mais sûre.
» alba.
» alpina (vrai).
» amarella (annuelle).
» Andrewsi.
» angulosa.
» angustifolia.
» asclepiadea.
» » à fleurs blanches.
» austriaca (annuelle).
» Baltica (annuelle).
» bavarica.
» Bigelowi.
» brachyphilla.
» brevidens.
» Burseri
» campestris (annuelle).
» carpathica.
» Clusii.
» cruciata.
» depressa.
» Favrati.
» Fetisowii.
» Freyniana.
» frigida.
» Frœchlichii.
» germanica (annuelle).
» glomerata.
» hybrida (straminea × Kesselringi).
» imbricata.
» Kesselringii.
» » à fl. blanches.
» Kochiana.
» lutea.
» macrophylla.
» » cyanea.
» Moorcroftiana.

Gentiana nivalis (annuelle).
» norica.
» Olivieri.
» pannonica.
» parryi.
» phlogifolia.
» Pneumonanthe.
» pumila.
» punctata.
» purpurea.
» Rocheliana.
» Rostani.
» Saponaria.
» Sceptrum.
» septemfida.
» » latifolia.
» straminea.
» straminea × Tibetica.
» tenella (annuelle).
» Tibetica.
» Tshiantanica.
» uliginosa.
» utriculosa.
» verna.
» » v. à fl. blanches.
» » var. grandiflora.
» » » atrocœrubea.
» Walujevii.
Geranium aconitifolium *(rivulare)*.
» albanum.
» albiflorum.
» argenteum.
» armenum.
» Bohemicum.
» carolinianum.
» cinereum.
» Endresii.
» Fremonti.
» grandiflorum.
» Grevilleanum.
» Ibericum.
» macrorhizum.
» mollissimum.
» nepalense.
» nodosum.
» palustre.
» phaeum.
» platypetalum.
» pratense.
Excellente plante pour rochers et plates-bandes, fleurissant tout l'été.
» Richardsoni.
» sanguineum.
» » à fl. blanches.
» sessiliflorum.
» subcaulescens.
» sylvaticum.

Geranium Traversi.
Gerbera Anandria.
» Abyssinica.
» Jamesoni.
» Kunzeana.
Geum atrosanguineum.
» australe.
» chilœnse (à fl. rouge très vif).
» coccineum *(idem)*.
» Heldreichii.
» heterocarpum.
» intermedium.
» laciniatum.
» macrophyllum.
» magellanicum.
» mauritanicum.
» montanum.
» pyrenaicum.
» reptans.
» Rhæticum.
» rivale.
» » grandiflorum.
» rubellum.
» triflorum.
» tyrolense.
» Wildenowi.
Gilia coronopifolia.
Gillenia trifoliata.
L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les pl. vivaces d'ornement, fl. blanc-rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge-brun, mai-sept.
Girgensohnia diptera.
Gladiolus palustris.
» » var pallidiflora.
Glaucium luteum.
» rubrum.
» squamigerum.
» tricolor.
» » grandiflorum.
Glaux maritima.
Globularia bellidifolia.
» cordifolia.
» nana.
» nudicaulis.
» salicina.
» trychosantha.
» vulgaris.
Glossocomia Clematidea.
Glycyrrhiza aspera
» darialica.
» uralensis.
Gnaphalium Leontopodium *(Edelweiss)*.
» japonicum.
» multiceps.
» norvegicum.
» supinum.
Gnaphalium sylvaticum.
Gutierrezia Euthamiæ.
Gymnadenia albida.
» conopsæa.
Gymnolomia multiflora.
Gypsophila alpicola.
» paniculata compacta.
» repens (pl. tombante de grande valeur ornementale pour les rochers.)
» Steveni.
» transylvanica.
» trichotoma.
Haberba Rhodopensis.
Hacquetia Epipactis.
Halenia Perrotteti.
Haloxylon Ammodenda.
Haplocarpha Leichtlini.
Hebenstreitia comosa.
Hedysarum boreale.
» coronarium.
» microcalyx.
» multijugum.
» neglectum.
» obscurum.
» polymorphum.
» Semenowi.
» sibiricum.
» songaricum.
Heeria elegans.
Heimia salicifolia.
Helianthella quinquænervis.
» uniflora.
Helianthemum alpestre (jaune).
» amabile (carmin).
» apenninum (blanc).
» atrosanguineum (rouge grenat).
» bicolor (jaune et rouge).
» canum (jaune).
» coccineum (rouge ardent).
» cruentum (rouge vif).
» Fumana (jaune).
» grandiflorum (jaune).
» Hymettium (jaune).
» mutabile (de plusieurs teintes).
» obscurum (jaune).
» œlandicum (jaune).
» polyfolium (blanc).
» roseum (rose clair).
» rubrum (rouge sombre).
» tomentosum (à feuilles blanc., fl. jaun.).
» vulgare (jaune).
Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la

fleur; culture très facile. Pl. naines et touffes, excell. pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et vite.

Helichrysum angustifolium.
» anatolicum.
» Stoekas.
Helleborus abschasicus.
» atrorubens.
» colchicus.
» fœtidus.
» niger (Rose de Noël).
» viridis.
Hemerocallis graminea.
Heracleum alpinum.
» dulce.
» giganteum.
» lanatum (Etats-Unis).
» Lehmannianum.
Heracleum Mantegazzianum.

Les gr. de cet Heracleum nous ont été apportées du Caucase en 1892. C'est une pl. superbe, gigantesque, et dont la description dans le « Nuove Giornale botanico italiano », vol. II, avril 1895, donne à peine une idée suffisante bien que l'auteur attribue au moins 10,000 fleurs à sa large ombelle que porte une hampe de 2 à 3 mètres de haut. C'est une bonne pl. viv., propre à isoler dans les pelouses, de culture extrêmement facile et à forte odeur anisée.

» montanum.
» orientale.
» pubescens.
» villosum.
Herniaria glabra.
» hirsuta.
» incana.
Hesperis nivea.
» sibirica.
» tristis.
Heuchera rubescens.
» purpurascens.
» sanguinea.

Délicieuse saxifragée des montagnes du Mexique, aux fl. rose vif et se succédant de mai en août.

» sanguinea alba.
» » grandiflora.
Heuchera sanguinea splendens.
» » maxima.
Hieracium albidum.
» aurantiacum.
Hieracium Bormülleri.
» lanatum.
» stoloniflorum.
» villosum.
Hippocrepis comosa.
Hirschfeldia adpressa.
Homogyne alpina.
» discolor.
Horminum pyrenaicum.
Houstonia cœrulea.
Hugueninia tanacetifolia.
Hydrophyllum virginicum.
Hypericum Androsæmum.
» aureum.
» calycinum.
» Coris.
» delphicum.
» densiflorum.
» empetrifolium.
» fragile.
» Gebleri.
» hircinum.
» hyssopifolium.
» Kalmianum.
» Lysimachioides.
» maculatum.
» montanum.
» nummulariæfolium.
» Olympicum.
» Orientale.
» origanifolium.
» patulum.
» perforatum (Millepertuis).
» poliphyllum.
» prolificum.
» Przewaldskyi.
» ptarmicæfolium.
» pulchrum.
» quadrangulum.
» Rhodopeum.
» Richeri.
» tomentosum.
» uralum.
Hypochæris carpathica.
» Helvetica.
» maculata.
Hyssopus cretaceus.
» officinalis.

Fl. très ar[illegible]matique, à fl. bleu foncé.

» officinalis à fl. blanches.
» » à fl. rouges.
» sp. Asie centrale.
Iberis commutata.
» gibraltarica.

Belle et bonne pl. à fl. se succédant pendant une bonne partie de l'année.

Iberis Jordani.
» jucunda *(Aethionema coridifolia)*
» sempervirens.
L'une des meilleures pl. à rocailles et bordures; fl. blanc pur, de mai en juillet; effet éclatant.
» sempervirens nana.
» stylosa.
» Taurica.
Impatiens glanduligera
» noli tangere.
» parviflora.
Imperatoria angustifolia.
» Ostruthium.
Incarvillea (voir pl. *vivaces).*
Inula Aschersoniana. Très belle pl. nouvelle des Balkans.
» ensifolia.
» glandulosa.
Sorte d'Arnica à très grandes fl. originaire du Caucase.
» grandiflora.
» Helenium (aulnée).
» macrocephala.
» montana.
» Polakii.
» viscosa.
Iris albida.
» arenaria.
» Bloudowi.
» bucharica.
» caucasica.
» coreana.
» ensata
» » v. chinensis.
» Fieberi.
» fœtidissima.
» Fontanesi.
» gigantea.
» Halophylla.
» iberica.
» Kamaonensis.
» laevigata.
» missouriensis.
» Mongolica.
» orchioides.
» » à fl. bleues.
» Polakii.
» prismatica.
» pseudo-Acorus.
» pyrenaica.
» reticulata.
» Robinsoniana.
» sibirica.
» » alba.
» » orientalis.
» » alte-cœrulea
Iris sindjarensis.
» sisyrinchium.
» Suziana superbissima.
» tridentata.
» versicolor.
» virginica.
» Watsoniana.
» sp. Werny.
» (voir en outre pl. *vivaces).*
Isatis alpina (vraie, récoltée dans le Haut-Queyras, sa station classique).
» brachycarpa.
» tinctoria.
Jasione humilis.
» montana.
» perennis.
Jeffersonia diphylla.
Juniperus Cedrus (du Pic de Ténériffe).
» communis.
» nana.
» Phoenicea.
» prostrata.
» Sabina
Kernera saxatilis.
Kitaibelia vitifolia.
Knautia arvensis alba.
Kochleria Valesiaca.
Lactuca perennis.
» » alba.
Lamium album.
Laserpitium gallicum.
» halleri.
» hispidum
» latifolium.
» peucedanoides.
» siler.
Grandes Ombellifères au feuillage ornemental.
Lasiagrostis Calamagrostis.
Lathyrus alatus.
» heterophyllus.
» incurvus.
» latifolius.
» maritimus.
» neurolobus.
» pratensis.
» roduntifolius.
» sylvestris.
Laurentia tenella.
Lavandula officinalis.
» spica.
» Stœkas.
» vera.
» » var. à fl. blanches.
Ledum groënlandicum.
Leontopodium alpinum (Edelweiss).
Semer dans un sol léger et tenir plutôt sec; repiquer jeune

et cultiver au soleil et dans sol calcaire. Diviser tous les deux ans.
Leontopodium altaicum.
» Himalayense.
» japonicum.
» sibiricum.
» transylvanicum.
Lepigonum rubrum.
Lepidium alpinum *(Hutschinsia)*.
» Auerswaldii.
Leucanthemum alpinum.
Leucojum æstivum.
Leuzea conifera.
Liatris (voir pl. *vivaces*).
Ligularia calthaefolia.
» macrophylla.
» sibirica.
» turkestanica.
Ligusticum discolor.
» pyrenaicum.
Lilium bulbiferum.
» canadense.
» chalcedonicum.
» cordifolium.
» croceum.
» dahuricum.
» dalmaticum.
» giganteum.
» Glehni.
» Grayi.
» Martagon (excellent pour les sous-bois).
» Martagon à fl. blanches.
» pomponium.
» pumilum.
» pyrenaicum.
» superbum.
» tigrinum.
Linaria alpina.
» » à fl. roses.
» anticaria.
» canadensis.
» cilicica.
» cymbalaria.
» » à fl. blanches.
» » var concolor.
» compacta.
» dalmatica.
» italica.
» macedonica.
» pallida.
» Pancicii.
» petræa (voisin d'alpina).
» purpurea.
» pyrenaica.
» reflexa
» spuria.
Linaria striata.
» tristis.
Lindelofia spectabilis.
Jolie Boraginée à fl. bleu foncé.
Linnæa borealis.
» » grandiflora.
» canadensis.
Linum alpinum.
» austriacum.
» campanulatum.
» catharcticum.
» flavum.
» hirsutum.
» hologynum.
» narbonense.
» perenne.
» » à fl. blanches.
» » à fl. roses.
» salsoloides.
» sibiricum.
» tenuifolium.
Les Linum alpinum, perenne et sibiricum sont de charmantes esp. à fl. bleu d'azur, fleurissant très longtemps. Culture facile.
Lithospermum graminifolium.
» intermedium.
» longiflorum.
» multiflorum.
» oleoides.
» petræum.
» purpureo-cœruleum.
Lloydia serotina.
Lobelia (voir pl. *vivaces*).
Lonicera alpigena.
» cœrulea.
» » nigra.
» pyrenaica.
Lotus corniculatus.
Lunaria rediviva.
Luzula albida.
» » rubra.
» lutea.
» nivea.
» Sudetica.
Lychnis alpina.
» » à fl. blanches.
» flos Jovis. *Fl. de Jupiter*.
» à fl. blanches.
» fulgens.
» Haageana.
» Lagascæ.
» Sieboldi.
» viscaria.
Jolie Carophyllée rose carmin vif, facile à élever de graines.
Lynosiris punctata.

Lynosiris vulgaris.
Lysimachia atropurpurea.
» clethroides.
» dahurica.
» dubia.
» ephemerum.
» kindigeri.
» punctata.
» quadrifolia
» thyrsiflora.
» verticillata.
» vulgaris.
Lythrum Salicaria.
» speciosum.
» virgatum.
Excellentes pl. pour les lieux humides.
Malva moschata.
Mandragora officinalis.
» vernalis.
Margyricarpus setosus.
Marrubium candidissimum.
» sericeum.
» velutinum.
Matthiola fenestralis.
» fragrans.
» sinuata.
Mayanthemum bifolium.
» canadense.
Meconopsis aculeata.
» cambrica.
(Pavot jaune.) Cette pl. est excellente pour les lieux frais et ombragés.
» cambrica à fl. orangées.
» integrifolia.
» oblongifolia.
» paniculata.
» petiolata.
» Wallichiana.
Medicago Echinus.
Melandrium rubrum.
Melica altissima.
» ciliata
» nutans.
» uniflora.
Melissa officinalis (Mélisse).
Mertensia ciliata.
» paniculata *(sibirica)*.
Meum athamanticum.
L'une des plus fines verdures qu'on puisse imaginer.
Meum Mutellinum.
Michauxia campanuloides.
Micromeria rupestris.
Mimulus alpina.
» alsinoides.
» cardinalis.
Mimulus cardinalis de couleurs variées.
Le M. cardinalis a les fl. rouge vermillon.
» Lewisii.
» luteus.
» primuloides.
Mirabilis multiflora.
Mœhringia ciliata.
» Griesebachi.
» Jankæ.
» muscosa.
» papulosa.
» pendula.
» sedoides.
Molospermum cicutarium.
Molucella spinosa.
Morine longifolia.
» persica.
Mulgedium alpinum.
» Bourgæi.
» plumieri.
» sibiricum.
Grandes laitues vivaces à fl. lilas bleu.
Myosotis alpestris (fl. bleu pur).
» lithospermifolia.
» palustris, bleu d'azur.
» var semperflorens.
» rupicola.
» Welwitchii.
Myrrhis odorata.
La Myrrhe, dont les racines sont fortement anisées.
Narcissus juncifolius.
Nepeta Camphorata.
» Cataria.
» kokkamirica.
» macrantha.
» menthoides.
» Mussini.
» Nepetella.
» nuda.
Nigritella angustifolia.
» suaveolens.
Nuphar luteum.
Nymphæa alba.
Odontospermum sericeum.
Œnothera arguta.
» densiflora.
» Fraseri.
» fruticosa.
Œnothera macrocarpa.
L'une des meilleures plantes de rocailles ; grandes fl. jaune clair, de juin en novembre.
» serrulata.
» speciosa.
» rosea.

Omphalodes Luciliæ.
Onobrychis montana.
» vicæfolia.
Ononis cenisia.
» fruticosa.
» natrix.
» rotundifolia.
» variegata.
Onopordon bracteatum.
Grand chardon aux feuilles argentées produisant un effet superbe et architectural.
Onosma armena.
» Bourgæi.
» Helveticum.
» pallida.
» poliphyllum.
» rupestris.
» sericeum. Merveilleuse espèce d'Orient introduite par nous.
» stellulatum.
Les Onosma sont des pl. superbes à longue et abondante floraison, faciles à élever.
Opuntia *(Cactées rustiques)*.
Origanum pulchrum. Superbe pl. aromatique aux fl. carmin entourées de brillantes bractées.
Orobus lathyroides.
» luteus.
» niger.
» tuberosus.
» vernus.
Ostrowskya magnifica.
Ourisia macrophylla.
Oxalis acetosella.
» atrosanguinea.
Oxybaphus nyctaginus.
Oxyria digyna.
Oxytropis Baïkalensis.
» campestris.
» Halleri.
» Jacquini.
» Lapponica.
» montana.
» ochroleuca.
» pilosa
» spicata.
» sulfurea.
» Tyrolense.
Pæonia (voir pl. *vivaces)*.
Palafoxia mexicana.
Papaver alpinum.
» alpinum, var. à fl. rouge vif, rouge cinabre, rose et jaune.
Ces pavots alpins sont d'entre les plus florifères, les plus gracieuses et les meilleures des pl. de roc. Leurs fleurs, très abondantes, affectent toutes les teintes. On peut les semer dans les rochers, les graviers, les fentes de murs et les lieux pierreux. Sol maigre et rocailleux.
Papaver alpino-nudicaule.
» atlanticum.
» caucasium.
» croceum.
» » var. du Saïran-Nor.
» Heldreichii.
» nudicaule.
» » à fl. blanches.
» » » jaune vif.
» » » rouge cramoisi.
» » » roses.
» » » soufrées.
» » Toutes teintes mélang.
Le pap. nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les pl. alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver ; bon pour la fl. coupée.
» oreophyllum.
» orientale.
» pilosum.
» pyrenaicum.
» radicatum.
» Rhæticum (de la Bernina).
» rupifragum.
» spicatum.
» strictum.
Paradisia Liliago.
» Liliastrum. Lis de Saint-Bruno ; facile à élever.
» Liliastrum major.
Pardanthus chinensis.
Paris quadrifolia.
Parnassia alpina.
» fimbriata.
» palustris.
Parochætus communis.
Paronychia argentea.
» Kapellae.
» nivea.
Parrya Menziesii.
» à fl. blanches.
Passerina nivalis.
Patrinia heterophylla.
» rupestris.
» scabiosæfolia.
Pedicularis atrorubens.
» Barrelieri.

Pedicularis cenisia.
» foliosa.
» palustris.
» retroflexa.
» rostrata.
» tuberosa.
» verticillata.
Pl. parasites à semer avec du gazon.
Peganum Harmala.
Peltaria alliacea.
Penthorum sedoides.
Pentstemon (voir pl. *vivaces).*
Pericome caudata.
Petalostemon tenuifolius.
Petasites albus.
» niveus.
» palmata.
Petrocoptis Lagascæ.
Peucedanum angustifolium.
Phaca alpina.
» astragalina.
» australis.
» frigida.
Phacelia tanacetifolia.
Phleum alpinum.
Phlomis alpina.
» Samia.
» tuberosa.
Phlox acuminata.
» Douglasi.
» fruticosa.
» maculata.
» pilosa.
Phygelius capensis.
Physalis alkelengi (Akékengee ou Coqueret).
» Bunyardi.
» Franchetti.
Physaria dydimocarpa.
Physochlaina orientalis.
Phyteuma austriaca.
» betoniæfolium.
» canescens.
» carestiæ.
» charmeli.
» comosum.
» corniculatrum.
» globulariæfolium.
» Halleri.
» hemisphæricum.
» humile.
» Micheli.
» nigrum.
» orbiculare.
» pauciflorum.
» Scheuchzeri.
» Scorzonerifolium.
Phyteuma serratum.
» Sieberi.
» spicatum.
Pinguicula alpina.
» grandiflora.
» Reuteri.
» vulgaris.
Pinus Cembro (Arolle).
» montana.
Plantago alpina.
» argenta.
» asiatica.
» montana.
Platycodon (voir pl. *vivaces).*
Pleurospermum austriacum.
Podophyllum Emodi.
» peltatum.
Polemonium cœrulum.
Pl. mellifère, éminemment propre à orner un jardin; fl. bleues très odorantes et se succédant sur la pl. de juin à septembre.
» flavum.
» foliossissimum.
» grandiflorum.
» humile.
» Hymalayense.
» molle.
» pauciflorum.
» reptans.
» Richardsoni.
» scapulorum.
» Tanguticum.
Les Polémoines sont d'admirables pl. viv., formant de jolies touffes d'une verd. fine et gaie, et portant de beaux panicules de fl. bleues, blanches ou jaunes odorantes.
Polygala chamæbuxus.
» Varedæ.
Polygonatum giganteum.
» multiflorum.
» verticillatum.
» vulgare.
Polygonum alpinum.
» amplexicaule.
» Baldschuanicum.
» Bistorta.
» » v. angustifolia.
» Brunonis.
» capitatum.
» molle.
» viviparum.
» Weyrischii.
Potentilla alchemilloides.
» adjarica.
» alpestris.

Potentilla ambigua.
» arbuscula.
» argentea.
» argyrophylla.
» atrosanguinea.
Fl. d'un rouge sanguin foncé.
» aurea.
» Baldensis.
» bifurca.
» caucasica.
» caulescens.
» chrysanta.
Jolie fl. jaune claire.
» Clusiana.
» crinita.
» delphinensis.
» Engadinensis.
» Fenzlii.
» fragiformis.
» Friedrichseni.
» frigida.
» fruticosa *(Potentille en arbre)*.
» fulgens.
» glandulosa
» gracilis.
» grandiflora.
» Hippiana.
» Hookeriana.
» hypoleuca.
» incanescens.
» Kleiniana.
» Kurdica.
» Lapponica.
» Levieri.
» montenegrina.
» multifida.
» Nepalensis.
Superbe esp. à fl. rose tendre veinées de carmin.
» nitida.
nivalis.
» pedemontana.
» peduncularis.
» petiolulata.
» pulcherrima.
» pyrenaica.
» recta.
» rupestris.
» Salesowiana.
» sanguisorbæfolia.
» sibbaldi.
» speciosa.
» tanacetifolia.
» taurica.
» Tormentilla.
» tridentata.
» tuberosa.
» valderia.

Potentilla viscosa.
» Willmottiana.
Pratia angulata.
Prenanthes purpurea.
Primula acaulis.
» » var. à fl. bleu foncé.
» fine mixed english vars.
» » var. orientalis.
» admontensis.
» algida.
» Arctotis.
» Auricula (type alpin).
» » var. horticoles.
» » marginata.
» Balbisii.
» Beesiana.
» bella
» Bellunensis.
» Berninæ.
» Boveana.
» Bulleyana.
» cadinensis.
» capitata (vrai, bleu foncé).
» cashmeriana.
» » à fl. blanches.
» » grandiflora.
» Cockburniana.
» confinis.
» cortusoides.
» Cottia.
» darialica.
» decipiens.
» denticulata.
» » var. à fl. blanches.
» » grandiflora.
» deorum.
» discolor.
» elatior.
» Facchini.
» farinosa.
» Floerkeana.
» floribunda (non rust. chez nous).
» Forbesi.
» Freynii.
» frondosa.
» glaucescens (calycina).
» glutinosa.
» grandis.
» hirsuta (très belle esp. à fl. carmin).
» integrifolia.
» intricata.
» intermedia.
» involucrata.
» Isabellina.
» japonica.
L'une des plus robustes, les hampes florales portent plu-

sieurs tiges de fl. du carmin le plus vif. Elle aime l'humidité.
Primula japonica à fl. blanches.
» » à fl. pourpre foncé.
» » picta.
» kewensis.
» latifolia.
» leucophylla.
» longiflora.
» luteola.
» macrocalyx.
» magellanica.
» marginata.
» megasæfolia.
» mollis.
» monacensis.
» muscariodes.
» nivalis.
» Obristii.
» œnensis.
» officinalis.
» pedemontana.
» Poissoni.
» Portæ.
» Potenschlagiana.
» pulveralenta.
» reticulata.
» rosea.
Du rose le plus vif qui se puisse rêver.
» rosea grandiflora.
» » superba.
» scottica.
» serrata.
» sibirica.
» Sieboldi.
» » variétés horticoles.
» Sikkimensis.
» spectabilis.
» tyroliensis.
» uralensis.
» variabilis (var. anglaises).
» venusta.
» veris(les meilleures var.anglaises)
» à fl. bleues.
» veninensis.
» verticillata.
» villosa.
» » var. eximia.
» viscosa.
La jolie Primevère carmin des Alpes granitiques.
» Vochinensis.
Prunella alba.
» grandiflora.
» incisa rubra.
» laciniata.
» pensylvanica.
Psoralea bitumimosa.
» macrostachya.
Pterocephalus Parnassi.
Pulmonaria rubra.
Putoria calabrica.
Pyrethrum achillæfolium.
» argenteum.
» densum.
» macrophyllum.
» roseum.
» Tschihatscheffii.
Pyrola secunda.
» uniflora
Ramondia nathaliæ.
» pyrenaica.
» » rosea.
Ranunculus aconitifolius.
Excellent pour les lieux frais et ombragés.
» alpestris.
» amplexicaulis.
» anemonoides.
» bilobus.
» caucasicus.
» crenatus.
» glacialis.
» graminæus.
» hybridus.
» Illyricus.
» Kamtschaticus.
» millæfoliatus.
» monspessulanus.
» montanus.
» orthorhynchus.
» platanifolius.
» parnassifolius.
» pygmaens.
» pyrenæus.
» rutæfolius.
» Seguieri.
» Thora.
» Traufellneri.
Rehmania angulata.
Reseda canescens.
» complicata.
fruticulosa.
» virgata.
Rhamnus pumila.
Rhaponticum cinarioides.
» Heleniifolium.
Rhazia orientalis.
Rhodiola linifolia.
» rubra.
» rosea *(Sedum Rhodolia)*.
Rhodocistus Bartholettianus.
Rhododendron chamæcistus.
» dahuricum.
» ferrugineum *(La Rose des Alpes)*

Rhododendron ferrugineum à fl. blanc.
» hirsutum.
» intermedium.
» Kamtschaticum.
» Kotschyi.
» lapponicum.
» myrtifolium.
Rodgersia podophilla.
Rodhea japonica.
Romanzoffia Sitchensis.
Romneya Coulteri.
Roripa pyrenaica.
Rosa alpina (Roses saxatiles).
» Beggeriana.
» berberifolia.
» Fentschenkoana.
» Kulikalanica.
» persica.
» Webbiana.
» Xanthina.
Rosmarinus officinalis.
Rubus arcticus.
» chamæmorus.
» illacebrus.
» leucodermis.
» Xanthocarpus.
Ruellia ciliosa.
Rumex alpinus.
» flexuosus (feuillage brun foncé).
» venosus.
Ruta angustifolia.
» graveolens.
» montana.
» patavina.
Ruscus aculeatus.
» racemosus.
Sagina Linnæi.
Salix reticulata.
» retusa.
Salvia acaulis.
» æthiopis.
» argentea.
» azurea.
» candelabrum.
» cypria.
» glutinosa (sauge à fl. jaunes).
» Horminum (bractées colorées).
» mellifera.
» officinalis.
» » major.
» » à fl. blanches.
» pratensis.
» » à fl. blanches.
» » à fl. roses.
» » bicolor.
» ringens.
» Sclarea.
» spathacea.
Salvia turkestanica.
» verticillata alba.
Samerarìa armena.
Sambucus racemosa.
Samolus Valerandi.
Sanguinaria canadensis.
Sanguisorba alpina.
» canadensis.
» Vallistellinæ.
Sanicula europaea.
» Marylandica.
Santolina chamæcyparissus.
» rosmarinifolia.
Saponaria bellidifolia.
» cæspitosa.
» glutinosa.
» lutea.
» ocymoides.
» » v. splendens.

Le sap. ocym. est l'une des meilleures des pl. de rocailles; elle croît au soleil, retombe gracieusement et se recouvre, en mai-juillet, de nombreuses fl. roses.

» officinalis.
» pulvinaris.
Sarcocapnos speciosa.
Sarothamnus scoparius.
Sarracenia purpurea.
Satureya diffusa.
» intermedia.
» montana.
» pymæa.
» repanda.
Saussurea alpina.
» albescens.
» decurrens.
» depressa.
» discolor.
» pygmæa.
Saxifraga aconitifolia.
» aizoides.
» » var. atrorubens.
» Aizoon.
» » à fl. rose vif.
» ajugæfolia.
» alberti.
» altissima.
» anceps.
» androsacea.
» aphylla.
» apiculata.
» aquatica.
» arachnoidea.
» aretioides.
» aspera.
» atropurpurea.

Saxifraga augustana.
» australis.
» Bertoloni.
» biflora.
» Boryi.
» brevifolia.
» bronchialis.
» Brunoniana.
» bryoides.
» bulbifera.
» Burseriana.
» cæsia.
» cæspitosa.
» californica.
» calyciflora (mædia).
» » × aretioides.
» canaliculata.
» capitata.
» carinthiaca.
» carniolica.
» carpathica.
» cartilaginea.
» catalaunica.
» ceratophylla.
» cernua.
» cervicornis.
» circuenta.
» cochlearis.
» coniferæe.
» controversa.
» coriophylla.
» Cotyledon.
» » × aizoon.
» crustata.
» cuneata.
» cuneifolia.
» Cymbalaria (annuel à fl. jaunes).
» cymosa.
» decipiens.
» demissa.
» diapensioides.
» diversifolia.
» eliator.
» Elisabethæ.
» erosa.
» exarata.
» Facchini.
» Ferdinand-Coburgi.
» flagellaris.
» flavescens.
» florulenta.
» Forbesi.
» Fortunei.
» Friedrich-Augusti.
» gemmifera.
» geranioides.
» Geum.
» Gibraltarica.

Saxifraga globulifera.
» gracilis.
» granulata.
» Grisebachii.
Guildford seedling.
» hederacea.
» Hedræantha.
» heucherifolia.
» Hieracifolia.
» Hirculus.
» » var. grandiflora.
» Hostei.
» Huetti.
» hypnoides.
» intacta.
» intricata.
» Iratiana.
» irrigua.
» juniperina.
» Kinlayi.
» Kolenatiana.
» Kotschyi.
» Labradorica.
» lævis.
» Lantoscana.
» lasiophylla.
» latepetiolata.
» leucanthemifolia.
» lingulata (vrai).
» longifolia (vrai).
» luteo-purpurea.
» luteo-viridis.
» Lyalli.
» macedonica.
» Mac Nabiana.
» madeirensis.
» mædia.
» marginata.
» micranthidifolia.
» moschata.
» muretti.
» muscoides.
» mutata (fl. orangé).
» nervosa.
» nivalis.
» Nutkana.
» oppositifolia.
» » grandiflora.
» palmata.
» patens (cæsia × mutata).
» pedata.
» pedatifida.
» pedemontana.
» peltata.
» pennsylvanica.
» pentadactylis.
» pentaphylla.
» petræa.

Saxifraga planifolia.
» polyphylla.
» Portæ.
» Probyni.
» Prostii.
» pseudo-sancta.
» pubescens.
» pulchella.
» punctata.
» pyramidalis.
» pyrenaica.
» ranuncifolia.
» recta.
» retusa.
» rhætica.
» Rhei.
» rivularis.
» Rocheliana.
» rosularis.
» rotundifolia.
» Salomoni.
» sancta.
» sarmentosa.
» scardica.
» Seguieri.
» serratifolia.
» sibirica.
» Siebthorpi.
» sponhemica.
» squarrosa.
» stellaris.
» stenoglossa.
» stenopetala.
» sturmiana.
» supraaizoides.
» Tellimoides.
» tenella.
» Thessalica.
» Tolmiæi.
» Tombeanensis.
» tricuspidata.
» trifida.
» Tyrolensis.
» umbrosa *(Désespoir du peintre)*.
» Valdensis.
» Vandelli.
» varians.
» virginiensis.
» Wettsteini.
» Zimmeteri.

Germent avec facilité, mais, à cause de l'extrême ténuité de leurs graines, il faut soigner les semis et ne pas arroser trop fort. Il est bon de ne pas recouvrir les gr. et de semer à la surface du sol.

Scabiosa agrestis.
Scabiosa agrestis à fl. blanches.
» amoena.
» argentea.
» Balcanica.
» caucasica.
» » à fl. blanches.
» dalmatica.
» darialica.
» graminifolia.
» japonica.
» lucida.
» » à fl. blanches.
» lyratifolia (fl. grenat vif).
» ochroleuca.
» Olgae.
» songarica.
» Wulfeni.
Schivereckia Bornmülleri.
» podolica.
Scilla japonica.
Scopolia carniolica.
» Tangutica.
Scorodonia fœtida.
Scorzonera austriaca.
» rosea.
Scrophularia alata.
» juratense.
» Marylandica.
» pyrenaica.
» vernalis.
Scutellaria alpina.
» » à fl. blanches.

La Scut. alp. est une excell. pl. traînante à fl. bleu lilas et blanc chez le type, très robuste et florifère.

» altissima.
» Baïkalensis.
» macrantha.
» tuberosa.
Sedum acre.
» aizoon.
» album.
» alsinæfolium.
» altissimum.
» anacampseros.
» anopetalum.
» annuum.
» asiaticum.
» atratum.
» Beyrichianum.
» Brownei.
» carpathicum.
» cœruleum
» dasiphyllum.
» divergens.
» Douglasi.
» elegans.

Sedum Ewersii.
» fabaria.
» Forsterianum.
» glaucum.
» hæmatodes.
» Hispanicum.
» kamtschaticum.
» Laggeri.
» Lydium.
» magellense.
» maximowiczii.
» maximum.
» middendorfii.
» nicaense.
» olympicum.
» oppositifolium.
» oreganum.
» pilosum.
» populifolium.
» pulchellum.
» purpurescens.
» reflexum.
» Rhodantum.
» rigidum.
» rubens.
» rupestre.
» Selskyanum.
» Sempervivum (vrai).
» spectabile.
» spurium.
» Stahlii.
» stenopetalum.
» stoloniferum.
» telephium.
» villosum.
» wallichianum.
Selliera radicans.
Sempervivum acuminatum.
» alpinum.
» arachnoideum.
» arvernense.
» assimile.
» atroviolaceum.
» austriacum
» boutignianum.
» Braunii.
» bungeanum.
» cinarescens.
» comoli.
» Delponti.
» Fauconnetti.
» flagelliforme.
» Fontanae.
» gaudini.
» glaucum.
» Haussmanni.
» heuffeli.
» hispidulum.
Sempervivum Kapaornikense.
» Lamottei.
» mettenianum.
» montanium.
» paronlum.
» patens.
» penninum.
» pomelii.
» Reginæ-Amaliæ.
» Requienii.
» robustum.
» rubicundum.
» Seguieri.
» spinulifolium.
» tectorum.
» Theobaldi.
» tomentosum.
» triste.
» turkestanicum.
» veninensis.
» Wulfeni.
» Zelebori.
» diverses espèces en mélange.
Senecio abrotanifolius.
» adonidifolius.
» ætnensis.
» alpinus.
» aurantiacus
» carniolicus.
» clivonum.
» cordatus.
» coriaceus.
» doronicum.
C'est le beau « *Soleil d'or* » des Alpes, à capitules orange : pl. très brillante et aimant le soleil et la rocaille.
» Fuchsii.
» incanus.
» jacquinianus.
» leucophyllus.
» Lingularia.
» macrophyllus.
» pseudo-Arnica.
» pulcher.
» quinquæligulatus.
» sarracenicus.
» stenocephalus.
» Tanguticus.
» tyrolense.
» Veitchianus.
» Wilsonianus.
Serratula monticola.
» radiata.
» Vulpii.
Seseli caespitosa.
» gummifer.
Sibbaldia maxima.

Sibbaldia parviflora.
» procumbens.
Sidalcea candida.
» malvæflora.
Sideritis Eubæa.
» hyssopifolia.
Jolie Labiée naine et touffue à fl. jaune soufre.
Silene acaulis.
» » à fl. blanches.
» alpestris.
» alpina.
» asterias (fl. en capitules, d'un rouge arden)t.
» auriculata.
» biflora.
» bryoides.
» ciliata.
» cordifolia.
» Correvoniana.
» dinarica.
» Elisabethæ.
Espèce superbe de Trentin.
» elongata.
» exscapa.
» fimbriata.
» flavescens.
» Fortunei.
» fruticulosa.
» galatea.
» Græfferi.
» Legionensis.
» Lerchenfeldiana.
» maritima.
» melandriformis.
» monachorum.
» multicaulis.
» odontopetala.
» oreades.
» Parnassi.
» petræa.
» pumilio.
» pusilla.
» quadrifida.
» reichenbachiana.
» rupestris.
» rupicola.
» saxifraga.
» Schafta.
L'une des rares pl. saxatiles d'automne; fl. d'un carmin vif cult. facile.
» Tatarica.
» valesia.
» Zawadsky.
Sissimbrium strictissimum.
Smilacina amplexicaulis.
» racemosa.
Smilacina stellata.
Smilax aspera.
» pseudochina.
» rotundifolia.
Sobolewskia clavata.
Solanum Dulcamara.
» rubrum.
Soldanella alpina.
» minima.
» montana.
» pusilla.
» pyrolæfolia.
Solidago alpestris.
» canadensis.
» gracilis.
» humilis.
» missouriensis.
» pallida.
» puberula.
» pygmæa.
» reflexa.
» Riddeli.
» rigida.
» rigidiscula.
» rugosa.
» serotina.
» Shortii.
» spectabilis.
Sphærophysa salsula.
Specularia Speculum.
Spigelia Marylandica.
Spiræa Aruncus.
La superbe Reine des bois aux grands panicules blancs.
» cæspitosa.
» filipendula.
» Kamtschatica.
» Ulmaria.
Stachys lanata.
» scardica.
Statice auriculæfolia.
» chinensis.
» coccinea.
» Gmelini.
» latifolia.
» occidentalis.
» sinensis.
» Suworowi.
» virgata.
Stenanthium occidentale.
Stipa gigantea.
» pennata.
Stobæa radula.
» membranifolia.
Stockesia cyanea.
Streptopus amplexifolius.
» brevipes.
» roseus.

Stylophorum diphyllum.
» lasiocarpum.
Styrax obassia.
Suæda fruticosa.
» arcuata.
» glauca.
Swertia connata.
» longifolia.
» perennis.
Symphiandra Hoffmanni.
Symphitum Bohemicun.
Synedesis aconitifolia.
Synthiris pinnatifida.
» reniformis.
Tamus communis.
Bonne pl. grimpante propre aux lieux ombrag., aux sous-bois, etc., se garnissant de baies écarlates à l'automne.
Tanacetum argenteum.
» macrophyllum.
» vulgare.
Taraxacum laponicum.
» Pseudoachillea.
Telekia speciosa.
» speciosissima (vrai).
Telephium imperati.
» orientale
Telespermum gracile.
Tellima grandiflora.
Tetragonolobus purpureus.
» siliquosus.
Teucrium Chamædrys.
» divaricatum.
» Eugenacum.
» flavum.
» lucidum.
» lusitanicum.
» massiliense (Herbe aux pommes).
» montanum.
» orientale.
» polium.
» Scorodonia. Excellent pour sous-bois.
Thalictrum aquilegifolium.
Le délicat Pigamont aux élégants panicules lilas.
» adiantifolium.
» cornuti.
» fœtidum.
» majus.
» minus.
Jolie verdure fine et gracieuse.
» occidentale.
» saxatile.
Thermopsis Fabacea.
» lanceollata.
» montana.
Thermopsis rhombifolia.
Thlaspi bellidifolia.
» cepæfolia.
» Kowatzi.
» microstyla.
» rotundifolium.
» violascens.
Thladianthia dubia.
Thymus marchallianum.
» serpyllum.
Tiarella cordifolia (jolie pl. d'ombre).
» purpurascens.
Tofielda calyculata.
» glacialis.
» glutinosa.
» rubescens.
Tolmiæa Menziesii.
Tommasinia purpurascens.
» verticillaris.
Tournefortia heliotropioides.
Towsendia grandiflora.
» Wilcoxiana.
Trachydium obtusiusculum.
Tradescantia pilosa.
Tragopogon porrifolius.
Trautvetteria palmata.
Trientalis europea.
» canadensis.
Trifolium alpinum.
» Badium.
» ochroleucum.
» pannonicum.
» saxatile.
» spadiceum.
Triglochin palustris.
Trillium atropurpureum.
» cernuum.
» grandiflorum.
» pendulum.
Triosteum pinnatifidum.
Trisetum măcrochætum.
Trochysanthes nudiflorus.
Trollius albiflorus.
» altaicus.
» americanus.
» asiaticus.
» aurantiacus.
» caucasicus.
» europæus.
Le beau « Globe d'or des rég. mont. qu'on élève et cultive facilement. Il fleurit abondamment si on lui donne un sol sain et une situation un peu fraîche. On en fait aussi de merveilleux bords d'étangs ou ruisseaux.
» hybridus.
» japonicus.

Trollius ledebourii.
» pumilus.
» sibiricus.
» Transylvanicus.
Tropæolum poliphyllum.
Tulipa greigii.
» marjoletti.
Tunica olympica.
» saxifraga.
Ulex europaeus (ajonc).
Umbilicus semenovi (v. en outre Cotyledon).
Uniola latifolia.
Vaccinium Myrtillus *(Myrtille)*.
» oxycoccos.
» pennsylvanicum.
» uliginosum.
» Vitis-Idæa *(Airelle)*.
Valeriana alliariæfolia.
» exaltata.
» globulariæfolia.
» integrifolia.
» longiflora (merveille orientale aux fl. rouge carmin vif).
» macrophylla.
» montana.
» officinalis.
» pyrenaica.
» Saliunca.
» sitchensis.
» supina.
» tripteris.
Vancouveria hexandra.
Vella spinosa.
Veratrum album.
» californicum.
» nigrum.
Verbascum Blattaria.
» Hænki.
» Olympicum.
» Phœniceum.
» Songaricum.
» Thapsus.
Verbena venosa (Verveine rustique).
» urticifolia.
Veronica Allionii.
» alpina.
» aphylla.
» argentea.
» Balcana.
» bellidioides.
» caucasica.
» Chamœdrys.
» crassifolia.
» foliosa.
» fruticulosa.
» gentianoides.
» grandis.

Veronica incana.
» longifolia.
» maritima.
» maxima.
» multifida.
» nummularia.
» officinalis.
» orientalis.
» paniculata.
» Ponæ.
» prenja.
» prostrata.
» rupestris.
» satureyoides.
» saxatilis.
» » à fl. blanches.
» serpyllifolia.
» spicata.
» » à fl. blanches.
» Teucrium.
» Traversi.
» urticæfolia.
» virginica.
Vesicaria sinuata.
» utriculata. Belle esp. à fl. jaunes à planter dans les fentes de rochers.
Vicia amœna (Irkoutsk).
» dumetorum.
» fulgens.
» Onobrychioides.
» unijuga.
Vincetoxicum alpinum.
» nigrum.
» rubrum.
Viola æthiolica.
» adunca.
» arenaria.
» atlantica.
» biflora.
» Bosniaca.
» calcarata.
» » à fl. blanches.
» » flavescens.
» campestris.
» canina.
» » alba.
» cenisia.
» cognata.
» comollia (vrai).
» cornuta.
» » à fl. blanches.
» » var. Papilio.
» rosea.
» cucullata.
» declinata.
» delphinifolia.
» dissecta.

Viola distans.
» elatior.
» Florariensis (variété hybride, voisine de rothomagensis et qui fleurit perpétuellement; l'une des meilleures fl. alpines).
» glabella.
» gracilis.
» heterophylla (délicieuse pensée lilas, à macules violet pourpre, des Alpes du Tyrol italien).
» hirta.
» Jovi.
» Labradorica.
» latisepala.
» lutea.
» munbyana.
» nummularifolia. (L'une des plus brillantes d'entre les fleurs des Alpes-Maritimes).
» oreocallis.

Viola orphanides.
» palmata.
» parvula.
» pinnata.
» praemorsa.
» prionantha.
» pubescens.
» rothomangensis.
» Rydbergii.
» sarmentosa.
» uliginosa.
» Wiedemanniana.
» Zoyzii.

Vittadenia australis.
» triloba.

Wahlbergella apetala.
Waldstenia fragarioides.
Wahlenbergia gracilis.
» lobelioides.
Wulfenia carinthiaca.
Zauschneria californica.
Zoyzinia absinthifolia.

ADDENDA

Aethropappus pulcherrimus.
Alyssum Amanum.
Anthemis tinctoria.
Arenaria montana.
Caltha polysepala.
Campanula betulæfolia.
» carpathica grandiflora.
» cristallocalyx.
» fragilis.
» garganica.
» longistyla parviflora.
» persicifolia alba.
Colluria geoides.
Chrysanthemum cappadocicum.
» ceratophylloides.
Chysosphenium flagelliferum.
Dianthus pyridicola.
» calalpinus.
» subacaulis.
Digitalis orientalis.
Edrayanthus dinaricus.

Edrayanthus Pumilio.
Erodium guttatum.
Gentiana mongolica.
Gypsophila libanotica.
Helichrysum lanatum.
Leucojium autumnale.
Linaria alpina concolor.
Lindelofia afghanica.
Linum arboreum.
Lychnis lapponica.
Meconopsis racemosa.
» sinuata latifolia.
Mertensia primuloides.
Peucedanum austriacum.
Phacelia tanacetifolia.
Primula malacoides.
» kaufmanniana.
» monacensis.
» patens.
Salvia Bertoloni.
Saxifraga lapponica.



A Floraire.

Graines de plantes vivaces d'ornement.

Pour les plantes vivaces.

Les plantes vivaces, qui furent les premières fleurs que l'on introduisit dans les jardins, ont été refoulées à l'arrière-plan par les brillantes exotiques pour lesquelles on a dû construire des serres et des couches chaudes et qu'on a dû acclimater à force de frais et de soins. Abandonnées par le gros public elles sont restées l'apanage des gens de goût et des amateurs de belles choses; les artistes, les littérateurs, les amis du Beau et du Vrai reviennent aux plantes vivaces avec une ferveur digne de remarque. Ce sont leurs fleurs qui envahissent l'atelier du peintre et le cabinet de l'homme de lettres. Et ce sont les plantes vivaces, ces bonnes filles des zones froides ou tempérées, enfants souvent des frimas et des monts, qui servent les dessins de l'architecte paysagiste de notre époque. On en a assez des mosaïques qui sont une aberration du bon goût et la négation de l'art; on ne veut plus de ces corbeilles multi ou unicolores, gros pâtés colorés qui offusquent la vue de celui qui voue un culte aux belles choses ou au naturel. On leur préfère l'élégante silhouette d'une plante herbacée vivace dont les fleurs solides et innombrables sont une précieuse ressource pour les bouquets où l'arrangement des intérieurs.

Inondez vos salons et vos chambres de travail de ces flots colorés ou parfumés; que les fleurs animent vos maisons et poétisent votre existence et que, chaque jour, leurs charmes discrets élèvent vos âmes et agrémentent votre vie.

Pour cela, plantez d'espèces vivaces vos plates-bandes et vos massifs; détruisez les corbeilles monstrueuses et animez vos pelouses en plantant ici et là des touffes d'Anémones, d'Asters, de Kniphophias, de Delphinium, de Rudbeckias, etc.; plantez partout de ces belles plantes vivaces qui ne demandent rien, sinon qu'on coupe leurs tiges à l'automne et qu'on les laisse vivre en paix, donnant à foison fleurs et parfums sans rien exiger du jardinier.

Acanthus mollis.
» spinosus.
Agrostemma coronaria.
(Coquelourde, plante très florifère et solide, à nombreuses fleurs d'un carmin vif).
Althæa rosea.
Rose trémière à fl. simples, var. à fl. blanches, jaunes, blanc crème, roses, rouges ou brunes, séparées ou mélangées.
Althæa rosea les mêmes à fleurs pleines en variétés ou mélange.
Alyssum saxatile (Corbeille d'or).

Anchusa Barrelieri.
» Dropmoreana.
Cette var. est l'une des meilleures pl. à fl. bleues; elle fleurit tout l'été.
» » var. opale.
» italica.
» officinalis.
» sempervirens.
Sorte de Bourraches vivaces à fl. d'un bleu intense et très pur.
Anemone japonica.
» sylvestris à grandes fleurs.
(Très belle esp. de cult. facile).
Antirrhinum majus (Gueule de loup.)
» » var. atrosanguinea.
» var. Light rose.
Aquilegia alba (Ancolie blanche).
» california (rouge et jaune).
» hybrida
» canadensis.
» » nana.
Nombreuses fleurs d'un beau rouge cinabre.
» chrysantha.
Fleurs jaunes à très longs éperons.
» delicatissima.
» flabellata nana.
Pl. japonaise naine à nombreuses fl. blanches; très précoce.
» Haylodgensis.
Très belles var. anglaises à grandes fl. multicolores.
» hybrida.
Var. à grandes fl. de teintes très variées et brillantes.
» Jetschani, fl. rouge et jaune.
» nivea grandiflora.
» vulgaris.
Les Ancolies sont excell. pour la garniture des endroits frais, des sous-bois pour émailler les pelouses, pour plates-bandes ou rochers. Leur abondante floraison, l'élégance de leurs fleurs, leurs couleurs vives et variées, et surtout le fait qu'elles sont robustes et de cult. extrêmement simple les recommandent à tous. Leurs graines germent de suite.
Archangelica officinalis (Angélique).
Asclepias Cornuti.
» Hallii.
» incarnata.
» rubra.
» speciosa.
Asclepias tuberosa.
Bonnes pl. vivaces florif. et solides dont les graines ont l'aspect d'oiseaux.
Aster bessarabicus.
Très belle espèce à nombreuses fl. bleu et or.
» diffusus.
» lævis.
» Patersonni.
» Porteri (Aster nain à fl. blanches, fleurissant d'août en novembre).
» trinervius.
Bocconia (Macclaya) cordata.
» microcarpa.
Boltonia glastifolia.
Calystegia dahurica (liseron rose vivace).
Campanula Alliariæfolia.
Belle pl. à gr. fl. blanches, penchées, formes élégantes.
» cantburyana.
» carpathica.
Excellente pour bordures et former des tapis.
» eryocarpa.
Très belle et grande esp. à grandes fl. bleu violet.
» Fergussoni.
» Medium. (Camp. carillon; bisann).
» var. calycantha.
» persifolia « *La Fée* ».
» persicifolia alba.
» pyramidalis.
Pl. excellente pour garnir les vieux murs, les grands rochers, les graviers, les pentes arides, au soleil. Elle fleurit de juillet-août en novembre et constitue une des meilleures pl. d'ornement dans les jardins alpins ou les plates-bandes. Culture facile.
Camp. pyramidalis à fl. blanches.
» Trachelium à fl. doubles.
Catananche cærulea.
Centaurea babylonica.
Très haute espèce, fl. jaune orangé.
» macrocephala.
Bonne espèce à ros capitules jaunes.
Centranthus ruber.
C'est la Barbe de Jupiter ou Valérianne rouge vif, l'une des plus recommandables pl. d'orne-

ment. Fait admirablement dans les fentes des murailles.
Centranthus ruber à fl. blanches.
» » à fl. rouge très foncé.
Cheiranthus Cheiri.
Chelone barbata.
» » hybrida.
» glabra alba.
Les chélones sont d'excellentes pl. vivaces aux fl. rouge vermillon ou carmin ou rose, etc., de cult. facile et dont les graines germent avec facilité.
Clematis integrifolia.
» recta.
» » var. purpurea.
Coreopsis grandiflora.
» lanceolata.
» tripteris.
Les Coreopsis sont d'excellentes pl. d'ornement, très florifères; grandes. d'un jaune vif, se succédant de juillet en novembre. Cult. facile.
Crambe cordifolia.
» maritima.
» orientalis.
» tatarica.
Crucianella stylosa, très jolie pl. tapissante : fl. roses.
Cucurbita perennis.
Delphinium azureum (d'un azur t. pur).
» » var. albidum.
» Chinense (du plus beau bleu).
» » à fl. blanches.
» » à fl. roses.
» Formosum (esp. superbe d'un bleu intense).
» grandiflorum.
» » à fl. blanches.
» » à fl. roses.
» » nanum compactum.
» hybridum.
Mélanges des meilleures variétés dans les meilleurs bleus.
» superbissimum (indigo).
» Tatzuense.
Les Dauphinelles ou pieds d'alouettes vivaces sont d'entre les meill. des pl. d'ornement. Cult. facile et flor. prolongée si l'on a soin de couper les tiges après la floraison.
Dianthus barbatus (œillet des poètes).
» » var. à fl. brun noir.
» plumarius.
Excellente pl. pour garnir les talus, les murs, les lieux arides ; fl. abondantes et très odor. se succédant tout l'été. Elle s'élève facilement de graines.
Digitalis purpurea.
» purpurea alba.
Les Digitales sont de bonnes pl. à fl. nombreuses, grappes dressées ; cult. facile.
Echinacea intermedia.
» purpurea.
Excellente pl. vivace s'élevant de 60 à 80 cm. et produisant pendant cinq ou six mois de grandes marguerites d'un rouge vin foncé ; bonne pour les bouquets.
Echinops Ritro.
Gros chardon bleu de forme sphérique).
» sphœrocephalus (le même en lilas)
Erigeron speciosus.
Grand aster bleu vivace.
Eryngium giganteum.
Pl. de teinte gris plomb.
» creticum.
Involucre, épis et tiges bleu foncé.
» planum.
Fl., involucres et tiges d'un bleu violacé ; on la sèche pour bouquets d'hiver.
Tous ces Eringium ont l'aspect de Chardons bleus, bien qu'ils appartiennent aux ombellifères. Ce sont d'excellentes pl. d'ornement, propres à garnir les lieux arides.
Eschscholzia aurantiaca.
Papavéracée bisannuelle et très florifère qui se sème naturellement dans les plates-bandes ou les graviers et fleurit toute l'année, même l'hiver quand il n'est pas très rigoureux.
» rubra (fl. rouge vif).
Eupatorium ageratoides.
Bonne pl. viv. à fl. blanc pur ; florais. prolongée ; cult. facile.
» altissimum.
» cannabinum à fl. blanches.
» serotinum.
» verticillatum.
Gaillardia aurantiaca.
» aristata.
» grandiflora.
» maxima.
Les Gaillardes sont d'excellentes pl. d'ornement, à grandes

fleurs jaune et rouge, fleurissant abondamment tout l'été.
Galatella incisa.
Galega officinalis.
» » à fl. blanches.
» orientalis.
» persica.
Solides Papillionacées à floraison prolongée.
Galtonia candicans.
Gaura Linheimeri.
Excellente pl. d'ornement qui fleurit pendant tout l'été et supporte les plus fortes sécheresses.
Geranium pratense.
Bonne espèce très rustique et très florifère.
Geum coccineum.
Superbe pl. à fl. d'un rouge vermillon.
» cocc. var. atrosanguineum.
» » var. à fl. doubles.
Ces Benoîtes à fl. rouge vif sont de semis et cult. faciles, et réussissent bien dans les sols sains, fleurissent de mai à octobre.
Glaucium luteum (Pavot à fl. jaunes et à feuillage argenté, très ornemental).
» rubrum.
» tricolor; superbe pl. à fl. rouge vermillon, jaune et noir.
Grindelia cuneifolia.
» patens.
» robusta.
Très belles composées à grands capitules jaune soufré, excellentes pl. d'ornement et bonnes pour bouquets.
Gypsophila paniculata. (L'une des meilleures pl. vivaces pour la fleur coupée; très solide et longuement florifère).
» scorzoneræfolia, fl. rose clair.
Hablitzia tamnoides.
Helenium autumnale.
» Hopesii.
Helianthemum mélangés de toutes couleurs.
Excellentes pl. basses, très florif., dont nous avons une collection complète (voir p. 16). Il en est de toutes teintes et couleurs. Elles sont faciles à élever de gr. et très ornementales.
Helianthus ciliaris.
» debilis.
» maximilianus.
Helianthus pumilus.
» rigidus.
» strumosus.
Heliopsis lævis.
» Pitcherianus.
» scabra.
Hemerocallis graminea.
Heracleum giganteum.
» Mantegazzianum.
Les Her. sont des pl. d'ornement aux formes architecturales et propres à garnir les lieux sauvages et pittoresques. Ils aiment la fraîcheur et la mi-ombre.
Hesperis matronalis (Girarde odorante).
Hisbiscus militaris.
» palustris.
» roseus.
Superbe pl. d'ornement aux très grandes fl. roses; cult. facile.
Incarvillea Delavayi.
» grandiflora.
» Olgæ.
L'Inc. Delavayi est l'une des meilleures acquisitions de l'horticulture depuis quelques années; belle pl. à très grandes fl. roses ressemblant à des *Gloxinias*, nombreuses et bonnes pour bouquets; juin-août. Plante solide; soleil; vient facilement de graines.
Ipomæa leptophylla.
» pandurata.
Beau liseron vivace très rare dans les cultures.
Iris ensata.
» gigantea.
» lævigata *(Kampferi)*.
» » variétés japonaises en mélange.
» missouriensis.
» Mongolica.
» pseudo-acorus.
» Robinsoniana.
» sibirica.
Jolie pl. aux nombreuses fl. bleu foncé.
Lathyrus latifolius (Pois à fl. vivace).
» » à fl. blanches.
Leucanthemum maximum.
Liatris elegans.
» graminifolia.
» punctata.
» pycnostachya.
» scariosa.

Liatris spicata.
Pl. d'ornement de grande valeur aux épis roses, fleurissant en commençant par le haut.
Lilium candidum.
Linum perenne à fl. bleu d'azur.
» » à fl. blanches.
» » à fl. roses.
Les Linum perenne sont de délicieuses pl. à floraison gracieuse et presque permanente; culture facile.
Lobelia cardinalis, vrai.
» fulgens.
» Gerardi.
» inflata.
» Kalmii.
» Kamtschatica.
» linnaeoides.
» Lugdunensis.
» sessilifolia.
» speciosa.
» syphilitica.
Lychnis chalcedonica (Croix de Malte).
» » à fl. blanches.
» » à fl. roses.
» Viscaria.
» » var. à fl. blanches.
» » var. splendens.
Les Lychnis sont de bonnes pl. d'ornement très florifères. Ils s'élèvent avec facilité par semis et sont de culture très aisée.
Maclaya cordata.
» microcarpa.
Connues également sous le nom de Bocconia, ces pl sont d'entre les meilleures pl. vivaces à feuillage ornemental. Elles font merveille, isolée dans les pelouses ou pour la décoration des jardins pittoresques.
Monarda dydima.
» » alba.
» fistulosa *(thé d'Oswego)*.
» Kalmiana.
» purpurea.
Les Monardes sont d'excellentes pl. vivaces, odoriférantes, très rustiqnes et florifères; fleurs ornementales et bonnes pour les bouquets.
Obeliscaria columnaris.
» pulcherrima.
Onopordon bracteatum.
Pl. superbe, épineuse, à fl. d'argent, à formes architecturales, propre à isoler dans les gazons.
Onopordon Illyricum.
» sibthorpianum.
Onothera macrocarpa.
Pl. basse et traînante, à très grandes fl. jaunes fleurissant 4 ou 5 mois durant; cult. facile.
Pæonia albiflora.
» anomala.
» Beresowskyi.
» coralina.
» decora *(romanica)*.
Espèce superbe à fl. d'un rouge très ardent.
» lutea.
» officinalis.
» Russi.
» peregrina.
» tenuifolia.
» triternata.
» Wittmanniana.
Les Pivoines types sont de très belles pl. d'ornement. Leurs graines germent toujours mais seulement au bout d'une année et même deux.
Pancratium Illyricum.
Papaver involucratum.
Enorme fl. d'un rouge éclatant.
» maximum.
Très belles fl. mesurant plus de 30 cent. de diamètre; pétales d'un rouge sang très ardent; la plus décorative et la plus richement colorée des pl. vivaces.
» » var. nanum splendens.
» nudicaule (Pavot d'Islande).
Le Pavot d'Islande est peut-être la meilleure des pl. vivaces, car la fl. en est gracieuse et très apparente et se conserve longtemps dans l'eau; en outre, la pl. fleurit pendant une bonne partie de l'année, à l'ombre ou au soleil. Elle préfère les sols légers et pierreux aux sols argileux mais va partout assez bien. Elle s'élève avec facilité par semis.
» Orientale.
Très gros pavot rouge, pl. à grand effet; de culture extrêmement facile; lève bien de graines.
» orientale, vars :
Beauty of Lavermere, Bright-

Graines diverses.

Ammodendron Conolligi.
» Sieversi.
Asparagus Sprengeri.
Budleya variabilis.
Caesalpinia japonica.
Chamærops humilis.
Clematis Buchanani.
» coccinea.
» Douglasi.
» flammula.
» Fremonti.
» graveolens.
Très curieuse Clématite grimpante, portant des milliers de fl. jaunes pendant tout l'été.
» ligustifolia.
» montana.
» rosea.
» Stans.
» Tangutica.
» tubulosa.
» verticillaris.
» virginiana.
» Vitalba.
» Viticella.
Cneorum tricoccum.
Colutea arborescens.
» cruenta.
Cotoneaster Davidiana (horizontalis).
C'est le meilleur des arbustes de rocailles; ses branches s'étalent sur le roc en larges ragettes ou palmettes garnies de jolies feuilles luisantes et se couvrant littéralement de fleurs roses, puis de baies rouge vif qui persistent l'hiver. La graine lève facilement.
» Franchetti.
» frigida.
» laxiflora.
» microphylla.
» nummularia.
» pannosa.
Excellent arbuste, gracieux et gai, introduit dernièrement du Yun-Nan.
» sinensis.
» tomentosa.
» vulgaris.
Crataegus Fischeri.
» Jozana.
Cystisus Laburnum.
Desmosdium penduliflorum.
Dracæna Draco.
Elæagnus argenteus.
Elæagnus orientale.
Genista juncea.
Halimodendron argenteum.
Hippophæ Rhamnoides.
Idesia polycarpa.
Ilex verticillata.
Juniperus cedrus.
Kochia trichophylla.
Paliurus aculætus.
Phellodendron Amurense.
Polygonum Baldschuanicum.
Pyrus nigra.
Rosa alpina.
Eglantine des Alpes, sans épines.
» berberidifolia.
» dumetorum.
» Fortunei.
» Jundzillii.
» microcarpa.
» multiflora.
» pimpinellifolia.
» rubiginosa (Sweet bryar).
» rugosa.
» serafini.
» sericea.
» Thea (type).
Sophora flavescens.
Sorbus chamæmespilus.
» scandica.
Spartium junceum.
Statices des Canaries :
» arborescens.
» brassicæformis.
» fruticans.
» hybrida (macrophylla × arborescens).
» imbricata.
» macrophylla.
» macroptera.
» Perezii.
» puberula.
Les Statices des Canaries sont de superbes pl. à grandes fleurs lilas ou violet et dont plusieurs sont arborescentes. Elles ne sont malheureusement pas entièrement rustiques chez nous.
Ulex europæus (ajonc).
Wistaria longijuga.
» sinensis.
Xanthoceras sorbifolia.
Zanthoxylon alatum.
» Burgei.
Zelkowa crenata.
Zyziphus vulgaris.

Ouvrages de M. H. CORREVON

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR A FLORAIRE

(Les frais de port sont comptés en plus.)

Les Orchidées rustiques. Ouvrage de 250 pages, illustré de 34 gravures. . fr. 4. —

Flore colorée de poche. A l'usage des touristes, *dans les montagnes de la Suisse, de la Savoie, du Dauphiné et des Pyrénées. Epuisé.*

Les plantes alpines et de rocailles. *Leur culture et leur acclimatation dans nos jardins.* Un volume relié toile, de 200 pages avec plusieurs illustrations . . . . fr. 2. 50

Les Fougères de pleine terre, les Prêles Lycopodes et Sélaginelles rustiques. Un volume relié toile, 140 p. avec illustr. . . . . fr. 2. 50

Les Iris dans les jardins, par MM. H. Correvon et H. Massé. — Un vol. de 204 pages, avec 9 figures.

Culture des plantes alpines dans le sphagnum pour les climats méridionaux et secs.

Prix : 1 franc.

Le même en langue italienne : **1 franc.**

LISTE DES OUVRAGES DE M. CORREVON

qui sont épuisés et que l'auteur rachèterait volontiers.

Les plantes des Alpes, *Genève 1885*	tiré à	1200 ex.
Les Fougères rustiques, *Genève 1890*	»	1200 »
Flore coloriée de poche, *Paris 1898*	»	10000 »
Album des Orchidées, *Genève 1899*	»	800 »
Fleurs et Montagnes, volume de poésies, *Genève 1902*	»	1200 »

La Collection des ouvrages de M. CORREVON a obtenu le prix d'honneur

offert par la Société d'horticulture de Neuchâtel à l'Exposition nationale suisse, en 1896, et plusieurs médailles d'or, de vermeil et d'argent dans les Expositions françaises, italiennes et suisses.